

TM IDUNE + TM DERMAHEAL MESO

КОМБИНИРОВАННАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ «УСТАЛОЙ» КОЖИ

ООО «Флосаль»
www.flosal.com.ua
(+380 44) 331-6307

Международный холдинг Flosal разработал программу, основанную на комбинаторике трех препаратов различных групп: Idune 0,8%, Dermaheal meso SB, Dermaheal meso LL – и предназначенную для одномоментного решения проблемы «усталой» кожи, гиперпигментации различной локализации, для нормализации водного баланса, а также коррекции локальных жировых отложений в субментальной зоне.

Idune 0,8% (Laboratoires Genevriev, Франция) предназначен для нормализации водного баланса, которая достигается за счет стимуляции эндогенной гиалуроновой кислоты, уменьшает проявления купероза, выравнивает цвет лица.

Dermaheal meso SB (Caregen Co.LTD, Южная Корея) осветляет гиперпигментацию различного генеза и локализации при помощи пептидов. Благодаря сбалансированному составу оказывает сосудукрепляющее действие, уменьшая видимые проявления купероза, улучшает цвет лица, способствует осветлению темных кругов в периорбитальной зоне.

Dermaheal meso LL (Caregen Co.LTD, Южная Корея) – пептидный препарат для интенсивной липорегуляции, действие которого базируется на трех основных этапах, таких как эмульгация жиров (гидрированный лецитин), выведение продуктов липолиза (L-карнитин), интенсивный лифтинг (descapeptide-4).

ХОД ПРОЦЕДУРЫ

1 этап. Подготовка кожи (фото 1)

Выполняем демакияж препаратом по типу кожи. После очищения обрабатываем поверхность, где будут проводиться инъекции, раствором хлоргексидина.

2 этап. Анестезия (фото 2-3)

Проводим аппликационную анестезию с помощью обезболивающего крема, накладываем окклюзионную пленку. Через 20–30 минут поэтапно удаляем крем с тех зон, в которых будут проводиться инъекции, с помощью раствора хлоргексидина.

3 этап. Введение препаратов (фото 4-6)

Так как в одной процедуре совмещаются три различных препарата, необходимо обозначить зоны, в которые будет вводиться каждый из них. Схема введения: Idune 0,8% – фото 4, Dermaheal meso SB – фото 5, Dermaheal meso LL – фото 6.

4 этап. Работа с препаратом Idune 0,8% (фото 4)

Зоны введения: лоб, периорбитальная область (в том числе непосредственно у ресничного края), скулы, щеки, шея, декольте. **Цель введения:** нормализация водного баланса, профилактика фотостарения, улучшение цвета лица. Состав препарата: нестабилизированная гиалуроновая кислота 0,8% (1 млн Да). Объем препарата на процедуру: 1–2 мл, в зависимости от объема корректируемой зоны. Техника введения: микроинъекционная.

5 этап. Работа с препаратом Dermaheal meso SB (фото 5)

Зоны введения: лоб, периорбитальная область (костный край орбиты), скулы, щеки, шея, декольте. **Цель введения:** осветление пигментных пятен, нивелирование признаков купероза, улучшение цвета лица. Состав препарата: Pentapeptide-13, Oligopeptide-34, Oligopeptide-50, аскорбиновая кислота, арбутин, экстракт корня солодки. Объем препарата на процедуру: 2–5 мл. Техники введения: папулярная, двухуровневая.

6 этап. Работа с препаратом Dermaheal meso LL (фото 6)

Зоны введения: субментальная область («второй подбородок»). **Цель введения:** уменьшение локальных жировых отложений в субментальной зоне, лифтинг тканей. Состав препарата: Descapeptide-4, гидрированный лецитин, L-карнитин. Объем препарата на процедуру: от 1,5 до 5 мл, в зависимости от объема корректируемой зоны. Техника введения: болюсная в подкожно-жировую клетчатку.

7 этап. Завершение процедуры

Кожу вновь обрабатываем раствором хлоргексидина, после чего наносим препарат, завершающий инъекционную процедуру, – крем после инъекционных процедур Ialugen Cicatrisation (Laboratoires Genevriev, Франция).

Условные обозначения инъекционных техник:

● – микроинъекционная; ● – папулярная; ● – двухуровневая; ● – болюсная.

Табл. Расход препаратов

Название	Объем / количество	Расход на 1 процедуру	Количество процедур
Dermaheal meso LL	5 мл	1–5 мл	3–5
Dermaheal meso SB	5 мл	1–5 мл	3–5
Idune 0,8%	1 мл	1–2 мл	2–3

