


Данная инъекционная программа коррекции возрастных изменений охватывает два уровня воздействия: дермальный и субдермальный, что позволяет не только обеспечить ревитализацию тканей, но и получить видимый эффект лифтинга тканей уже с первой процедуры.



СИНЕРГИЯ ПЕПТИДНЫХ МЕЗОПРЕПАРАТОВ DERMACHEAL MESO В ANTI-AGE ПРОГРАММАХ:

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ, ЛИФТИНГ И ЛИПОЛИТИК В ОДНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОТ FLOSAL



В основе программы три инъекционных пептидных мезопрепарата: Dermaheal meso SR, Dermaheal meso HSR, Dermaheal meso LL — новейшие разработки лаборатории Caregeon Co. LTD (Южная Корея) — мирового лидера в сфере производства нано- и биотехнологий. Сочетание в одной процедуре этих препаратов позволяет свести к минимуму возрастные проявления даже у клиентов с выраженной отечностью параорбитальной области, не усиливая ее. А также решить проблему «второго подбородка», получив при этом выраженный лифтинг нижней трети лица.

Протокол процедуры

Шаг 1. Подготовка кожи.

Выполняем демакияж препаратом по типу кожи. После очищения обрабатываем поверхность кожи, где будут проводиться инъекции, раствором хлоргексидина.

Шаг 2. Анестезия. Вводим аппликационную анестезию с помощью анестезирующего крема, наносим окклюзионную пленку (фото 1). Через 20-30 минут поэтапно удаляем крем с тех зон, в которых будут проводиться инъекции, с помощью раствора хлоргексидина.

Шаг 3. Введение препаратов. Так как в одной процедуре совмещаются три

препарата, необходимо обозначить зоны, в которые будет вводиться каждый из них (фото 2):

- зона введения препарата Dermaheal meso SR — параорбитальная область;
- зоны введения препарата Dermaheal meso HSR — лоб, щеки, нижняя треть лица, не доходя до зоны «второго подбородка»;
- зона введения препарата Dermaheal meso LL — область «второго подбородка».

Шаг 4. Работа с препаратом Dermaheal meso SR.

Зона введения: параорбитальная область (фото 3).

Цель введения: уменьшение глубины морщин, восстановление эластичности кожи за счет стимуляции пролиферации фибробластов, синтеза коллагена. Препарат рекомендуется для параорбитальной области, так как не усиливает отечность.

Объем препарата на процедуру: 1 мл.

Рекомендуемые иглы: 30-32G длиной 4-13 мм.

Техники введения: папульная — препарат вводится на глубину 1 мм до формирования папулы с четкими границами, поверхность папулы имеет вид лимонной корочки.

Шаг 5. Работа с препаратом Dermaheal meso HSR.

Зоны введения: лоб, щеки, нижняя треть лица, не доходя до зоны «второго подбородка». Граница работы данным препаратом в параорбитальной области — костный край орбиты (фото 4).

Цель введения: интенсивный лифтинг тканей, уменьшение глубины мор-

щин, восстановление уровня увлажненности кожи, ее тургора и эластичности.

Объем препарата на процедуру: 2,5 мл.

Рекомендуемые иглы: 30-32G длиной 4-13 мм.

Техники введения:

- микроинъекционная — препарат вводится на глубину 2 мм, формируется небольшое возвышение с нечеткими границами, поверхность не имеет вид лимонной корочки;
- мультипунктурная — препарат вводится на глубину 2,5-3 мм под углом 45°, иглу вводим не полностью, как при линейной технике, а наполовину;
- линейная — препарат вводится на глубину 1,5 мм, игла не должна просвечиваться под кожей, но должны быть видны ее четкие очертания в толще кожи.

Шаг 6. Работа с препаратом Dermaheal meso LL.

Зона введения: область «второго подбородка» (фото 5).

Цель введения: интенсивный липолиз и лифтинг тканей нижней трети лица.

Объем препарата на процедуру: 1,5 мл.

Рекомендуемые иглы: 30G длиной 13 мм.

Техника введения: болюсная, внутри подкожно-жировой клетчатки. Объем препарата на одно введение — 0,1 мл.

Шаг 7. Завершение процедуры. Кожу вновь обрабатываем раствором хлоргексидина, после чего наносим препарат, завершающий инъекционную процедуру.